

## TEGEVUSTE JÄRJEKORD ERÜTROTSÜÜTIDE SUSPENSIOONI ÜLEKANDEL

### I. Patsiendi verekaardi VKL-225 vormistamine

- Täida patsiendi andmed verekaardil (sh diagnoos, anamnees).
- Mine patsiendi juurde, identifitseeri patsient, võrdle andmeid verekaardiga.
- Võta patsiendilt vereproov EDTA katsutisse (lilla korgiga), markeeri katsuti eHL juhtumi kleebisega patsiendi juurest lahkumata.
- Määra patsiendi veregrupp.
- Märgi esmane veregrupp verekaardile.
- Allkirjasta lahter „Vere võttis õde/laborant“.
- Registreeri katsuti eHL-is ja vormista elektroonne tellimus „ABO ja RhD, erütrotsütaarse antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga“.
- Saada katsuti koos verekaardiga verekeskusesse veregrupi määramiseks (kinnitav analüüs).

### II. Veretoote tellimine

- Võta verekaart ja täida vorm VKL-226 „Veretoote tellimine ja transfusiooniprotokoll“.
- Mine nendega patsiendi juurde, identifitseeri patsient, võrdle andmeid verekaardiga.
- Võta uus vereproov EDTA katsutisse (lilla korgiga), markeeri katsuti eHL juhtumi kleebisega patsiendi juurest lahkumata.
- Allkirjasta lahter „vere sobitamiseks võttis“.
- Allkirjasta lahter „veretoote tellis“.
- Registreeri katsuti eHL-is ja vormista elektroonne tellimus „Doonorivere sobivusproov“.
- Saada katsuti, „Verekaart“, „Veretoote tellimine ja transfusiooniprotokoll“ verekeskusesse.

### III. Vahetud ülekande-eelsed toimingud

- Peale verekomponendi saabumist osakonda kontrolli selle vastavust tellimuslehele ja patsiendi verekaardile, hinda verekomponenti visuaalselt ja kontrolli aegumise kuupäeva.
- Kontrolli kleebist patsiendi nimega verekomponendi tagaküljel.
- Täida transfusiooniprotokoll (Veretoote tellimine - pöördel).
- Identifitseeri patsient, võrdle andmeid.
- Määra patsiendi ja verekoti segmenti ABO vahetult enne ülekannet patsiendi juurest lahkumata ja kanna tulemused transfusiooniprotokollile.
- Palu arstil patsiendi juures hinnata veregrupi kontrolli ja ülekantava toote vastavust dokumentatsioonile.
- Rebi verekomponendi etiketi alumine osa ja kleebi transfusiooniprotokollile.
- Arst kirjutab etiketile oma nime ja allkirja ning annab loa alustada ülekannet.
- Märgi ülekande alguse kellaeg sellele etiketile.

Tähis	TKL-179
Viide	PKL-150
Versioon	04

#### IV. Ülekandeaegne jälgimine

- Enne ülekande algust mõõda patsiendil kehatemperatuur ja vererõhk.
- Ülekanne tuleb alustada 60 minuti jooksul ja peab olema lõpetatud 4 h jooksul.
- Jälgi ülekande algul 15 minutit pidevalt patsiendi üldseisundit.
- Dokumenteeri iga tunni järel ja transfusiooni lõpul kehatemperatuur, vererõhk.
- Dokumenteeri peale transfusiooni lõppemist kolme tunni jooksul iga tunni järel kehatemperatuur ja vererõhk.

#### V. Vereülekandereaktsiooni kahtluse korral tuleb verekomponentide jäägid säilitada ja hemolüütilise või septilise reaktsiooni kahtluse korral saata verekeskusesse.

#### VI. Dokumenteeri ülekanne patsiendi eHL päevikukandes, registreerides ülekantud dooside numbrid ja toote koodid. Vt JKL-243 „Verekomponentide ülekande registreerimine eHL-i päevikukandesse“.